



# GOUP<sup>®</sup> MICRO

Hayvansal Menşeli Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre



## Coşturur

 **Nufarm**  
Grow a better tomorrow



**Hayvansal Menşeli Aminoasit İçeren  
Sıvı Organik Gübre**

**Etkili Madde:**

Toplam Organik Madde %49  
Organik Karbon %20  
Organik Azot %7  
Serbest Aminoasit %16  
PH 6 - 8

| Bitki Adı                                                                                 | Kullanma Dönemi                                                                                                                                    | Yaprak Uygulamaları Kullanma Dozu                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Çilek                                                                                     | Kış dormansisinden önce, vegetatif gelişme başlangıcında, çiçeklenmeden 20 gün önce, meyve tutumu öncesi, üretim sezonu boyunca 20 gün aralıklarla | 150-250 ml/100 L su                                       |
| Sert Çekirdekli Meyveler                                                                  | Çiçeklenme öncesi, taç yaprak dökümü, meyve tutum dönemi, meyveler 6-8 cm çapında olduğunda                                                        | 200-250 ml/100 L su                                       |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler                                                               | Çiçeklenme öncesi, taç yaprak dökümü, meyve tutum dönemi, meyveler 6-8 cm çapında olduğunda                                                        | 200-250 ml/100 L su                                       |
| Zeytin                                                                                    | Tomurcuk oluşum dönemi, çiçeklenme öncesi ve meyve renk değişimi döneminde                                                                         | 200-250 ml/100 L su                                       |
| Bağ                                                                                       | Çiçeklenme öncesi, taç yapraklar döküldüğünde ve meyve renk değişimi döneminde                                                                     | 200-250 ml/100 L su                                       |
| Antepfıstığı, Fındık, Ceviz                                                               | Çiçeklenme öncesi, taç yapraklar döküldüğünde ve meyve tutumu döneminde                                                                            | 200-250 ml/100 L su                                       |
| Turunçgiller                                                                              | Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi                                                                                                             | 150-200 ml/100 L su                                       |
|                                                                                           | Taç yapraklar döküldüğünde, meyve tutumu döneminde, meyveler 6-8 cm çapında olduğunda                                                              | 200-250 ml/100 L su                                       |
| Muz                                                                                       | Çiçeklenme dönemi, meyve oluşumu dönemi ve renk değişimi dönemi                                                                                    | 200-250 ml/100 L su                                       |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Marul, Lahana, Brokoli, Karnibahar | Fide dikiminden 10-15 gün sonra, çiçeklenme öncesi, meyve tutumu ve meyve renk değişimi döneminde                                                  | Serada 150-250 ml/100 L su<br>Tarlada 200-250 ml/100 L su |
| Bitki adı                                                                                 | Kullanma Dönemi                                                                                                                                    | Toprak Uygulamaları                                       |
|                                                                                           |                                                                                                                                                    | Damlama Sulama ile Kullanım Dozu                          |
| Tüm Bitkiler                                                                              | Kritik Bitki Gelişim Dönemleri ( Dikim dönemi, çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve büyüme dönemi)                                               | 300-500 ml/da                                             |

Detaylı Teknik Bilgi için firma yetkililerini arayınız. **Teknik Bilgi için: +90 216 641 8 641**

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçı ürünün kalitesini garanti eder.

İmalatçı; ürünün depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

**RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:** NUFARM TURKEY KİMYEVİ MADDELER İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Mimar Sinan Mh. Mimar Sinan Cd. No: 67/3 PK: 34782 Çekmeköy / İSTANBUL Tel: +90 216 641 8 641

**info@nufarm.com**  
**nufarm.com**

